

## Močovina 46% prilovaná

**Výrobce:** FERTISTAV CZ a.s., T. G. Masaryka 971, Městec Králové, IČ: 25295274

**Číslo ohlášení:** O970

**Typ hnojiva:** 1.8

### Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost	Hodnota
Celkový dusík jako N v %	46,0
Amidický dusík jako N v %	46,0
Biuret v %	max. 1,0
Částice od 0,5 – 2,5 mm v %	min. 90,0
Částice pod 1 mm v %	max. 3,0

**Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:** kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 50.

### Rozsah a způsob použití

Močovina granulovaná je koncentrované dusíkaté hnojivo určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace. Pro základní hnojení se močovina aplikuje na povrch půdy. Pokud se do 24 hod. po aplikaci neočekává déšť je nutné močovinu ihned po aplikaci zapravit, aby nedocházelo ke ztrátám N do ovzduší ve formě plynného čpavku.

Doporučené dávkování:

Kultura	Dávka (kg/ha)
Obiloviny	100 – 150
Řepka	150 – 350
Cibuloviny	150 – 200
Kukuřice	200 – 250
Cukrovka	250 – 350
Brambory	200 – 250

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozborů půdy a rostlin).

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Upozornění:

Z požárně technického hlediska je močovina zařazena do třídy 6 podle CSN 46 5750. Teplota vzplanutí je 280 °C (zkušební metoda podle ČSN 64 0149).

#### **Podmínky skladování**

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Močovina a její zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

**Hnojivo se dodává balené a volně ložené.**

**Hmotnost balení:**

**Doba použitelnosti:** 36 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

**Číslo výrobní šarže:**

**Datum výroby:**