

PERLKA® Dusíkaté vápno**Výrobce:** AlzChem AG, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg, Německo**Dodavatel:** FERTISTAV CZ a.s., T.G.Masaryka 971, 289 03 Městec Králové, IČO: 25295268**Číslo ohlášení:** O1605**Typ hnojiva:** 1.2.1**Chemické a fyzikální vlastnosti:**

Vlastnost	Hodnota
Dusík celkový jako N v %	19,8
Dusičnanový dusík jako N v %	1,8
Vápník celkový jako CaO v %	50,0
Vápník vodorozpustný jako CaO v %	22,0

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.**Směs obsahuje:** Kyanamid vápenatý (CAS 156-62-7), Hydroxid vápenatý (CAS 1305-62-0), Dusičnan vápenatý (CAS 10124-37-5)**Rozsah a způsob použití:**

Dusíkaté vápno je možno používat na všechny půdy s výjimkou půd těžkých, je typickým hnojivem k základnímu hnojení. Vedlejším efektem je dezinfekce půdy před výsadbou. Nesmí se s ním hnojit v ochranných pásmech vodních zdrojů a nesmí se rozmetat na sníh. Pouze pro profesionální použití.

Doporučení dávkování (v g na 10 m² plochy za rok):

Plodina	Termín aplikace	Dávka (g/10 m ²)
Brambory	před výsadbou se zapravením	300-500
Travníky	ke hnojení (před nástupem vegetace)	200-400
Luskoviny (hrách, fazole...)	jeden až dva týdny před setím	200-300
Listová zeleniny (Salát, špenát ...)	2-3 týdny před vysetím, vysazením (lze aplikovat v předjaří i v létě)	300-500
Kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel ...)	2-3 týdny před výsevem	300-400
Plodová zelenina (rajče, okurka, paprika...)	2-3 týdny před výsevem, výsadbou	300-600
Cibulová zeleniny (cibule, pór, česnek ...)	Před vysetím, příp. před výsadbou	300-500
Košťálová zelenina (zelí, květák, kedluben, brokolice ...)	Na jaře, 3 týdny před výsadbou	300-600
Chřest	po oborání	300
Jahody zahradní	brzy na jaře mezi rostlinami	200-300
Okrasné dřeviny	v předjaří před rašením na suché rostliny	300-500
Ovoce	od časného předjaří až krátce před rašením	300-500

Dávkování je nutno přizpůsobit půdně-klimatickým podmínkám. Pro stanovení správného dávkování je nezbytné se obrátit na odborného poradce.

Podmínky skladování: uchovávejte v suchu v původním obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zajistit proti působení atmosférických podmínek. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí.

ČEŠTINA - Nebezpečí

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Bezpečnostní pokyny:

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

P261 - Zamezte vdechování prachu.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Likvidace obalu: Prázdný obal odevzdejte oprávněné osobě k likvidaci.

Likvidace zbytků hnojiva: zbytky hnojiva využijte k hnojení. Hnojivo nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Čistá hmotnost: Big-bag 600kg / Pytle 20kg, 2,5 kg / kbelík 1 kg

Doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení zákonných podmínek skladování.

Datum výroby/číslo výrobní šarže: